



Handelsname	Wirkstoff	Tier	Anwendung	Wirkung	Magen-Darm-würmer		Lungen-würmer	Kleiner Leberegel	Grosser Leberegel		Ektoparasiten	Absetzfrist (Tage)		Bemerkungen
					Larven und Adulte	Kapsel-Larve	Adulte		Larve	Adulte		Milch	Fleisch	
Albex 10 %	Albendazol	Rind, Schaf, Ziege	oral	sofort	x	x	x			x		Rind: 3,5 Schaf, Ziege: 5	Rind: 7 Schaf, Ziege: 21	Während Deckzeit und 1. Trächtigkeitsmonat nicht anwenden (teratogen)
Baycox 5 %	Toltrazuril	Kalb, Lamm	oral	sofort									Kalb: 63 Lamm: 42	Lamm < 9 Monaten gegen Kokzidien <i>Eimeria crandallis</i> und <i>E. ovinoidalis</i> , Kalb gegen <i>E. zuernii</i> und <i>E. bovis</i>
Bayticol	Flumethrin	Rind	pour-on	andauernd							x	3	0	Räude, Läuse, Zecken
Bovilis Dictol	bestrahlte Larven	Rind	oral	Impfung			x					0	0	2 Gaben in 4 Wochen Abstand, 1. mindestens 6 Wochen vor Weidebeginn
Butox Protect 7.5 Pour-on	Deltamethrin	Rind, Schaf	pour-on	andauernd							x	Rind: 0 Schaf: 0,5	Rind: 18 Schaf: 1	Gegen Läuse und Fliegen
Carbesia	Imidocarb	Rind	subkutan	andauernd								21	213	Gegen Babesiose; nicht intravenös oder intramuskulär
Cestocur	Praziquantel	Schaf	oral	sofort	x							0	0	Gegen Bandwürmer <i>Moniezia ssp</i>
Chronomintic	Levamisol	Rind	Bolus	kontinuierliche Abgabe	x	x	x					NA	140	
Closamectin Pour-on	Closantel + Ivermectin	Rind	pour-on	andauernd	x		x			x	x	NA	28	Nur Mischinfektionen Nematoden und grosser Leberegel
Cydectin 0,1 %	Moxidectin	Schaf	oral	andauernd	x	x	x				x	5	7	Nur adulte Lungenwürmer <i>Dictyocaulus filaria</i>
Cydectin 0,5 %	Moxidectin	Rind	pour-on	andauernd	x	x	x					0	14	Mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmmimpfung
Cydectin 2 % LA	Moxidectin	Schaf	subkutan Ohr	andauernd	x	x	x				x	NA	104	Absetzfrist nur gültig für Injektion hinter Ohr; nicht für Milchschafe
Cydectin 10 % LA	Moxidectin	Rind	subkutan Ohr	andauernd	x	x	x				x	NA	108	Absetzfrist nur für Ohrinjektion gültig; gegen Dasselffliegen, Läuse, Räude; späteste Anwendung 80 Tage vor Abkalben
Dectomax 0,5 % Pour-on	Doramectin	Rind	pour-on	andauernd	x	x	x				x	NA	35	Späteste Anwendung 60 Tage vor Abkalben; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmmimpfung
Dectomax injection	Doramectin	Rind, Schaf	subkutan Hals	andauernd	x	x	x				x	NA	Rind: 70 Schaf: 70	Späteste Anwendung Rind: 28 Tage vor Abkalben; Milchschaaf: 70 Tage vor Ablammen; mindestens 15 Tage nach 2. Lungenwurmmimpfung
Deltanil 10	Deltamethrin	Rind, Schaf	pour-on	andauernd							x	0	Rind: 17 Schaf: 35	Gegen Zecken, Schaflausfliegen, Schmeissfliegen (Schafe), Fliegen (Rinder), Läuse
Endex 8,75 %	Triclabendazol+Levamisol	Schaf	oral	sofort	x	x	x		x	x		NA	28	Mischinfektion Nematoden und grosser Leberegel
Endex 19,5 %	Triclabendazol+Levamisol	Rind	oral	sofort	x	x	x		x	x		NA	28	Mischinfektion Nematoden und grosser Leberegel
Eprinex Multi 5 mg/ml ad us.	Eprinomectin	Rind, Schaf, Ziege	subkutan	andauernd	x	x	x						Rind: 15 Schaf: 2 Ziege: 1	Gegen Dasselffliegen Läuse, Räude, Haarlinge (Rind), Ziegen und Schafe nur gegen gastrointestinale und pulmonale Strongyliden
Eprinex Pour-on	Eprinomectin	Rind, Ziege	pour-on	andauernd	x	x	x				x	0	15	Gegen Dasselffliegen, Läuse, Räude (Rind); Ziegen nur gegen Nematoden; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmmimpfung
Eprivalan Pour-on	Eprinomectin	Rind, Ziege	pour-on	andauernd	x	x	x				x	0	15	Gegen Dasselffliegen, Läuse, Räude, Haarlinge (Rind); Ziegen nur gegen Nematoden; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmmimpfung
Eprizero	Eprinomectin	Rind	pour-on		x	x	x				x	0	10	Gegen Dasselffliegen, Läuse, Räude, Haarlinge, Weidestechfliegen; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmmimpfung
Halocur	Halofuginon	Kalb	oral	sofort									13	Prävention und Behandlung von Durchfall wegen <i>Cryptosporidium parvum</i>

Legende: Ektoparasiten = Äussere Parasiten NA = Nicht Anwenden bei laktierenden Tieren pour-on = Äussere Anwendung am Rücken subkutan = unter die Haut Bolus = Kapsel im Pansen

Quelle: Tierarzneimittelkompendium September 2023



Handelsname	Wirkstoff	Tier	Anwendung	Wirkung	Magen-Darm-würmer		Lungen-würmer	Kleiner Leberegel	Grosser Leberegel		Ektoparasiten	Absetzfrist (Tage)		Bemerkungen
					Larven und Adulte	Kapsel-Larve	Adulte		Larve	Adulte		Milch	Fleisch	
Neoprinil Pour-on	Eprinomectin	Rind	pour-on	andauernd	x	x	x				x	0	15	Mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmpfimpfung
Noromectin	Ivermectin	Rind, Schaf	subkutan	sofort	x	x	x				x	NA	Rind: 28 Schaf: 42	Späteste Anwendung 28 Tage vor Abkalben/Ablammen; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmpfimpfung; nicht intravenös oder intramuskulär; Ivermectin wirkt nicht gegen Bandwürmer und Leberegel
Noromectin pour-on	Ivermectin	Rind	pour-on	andauernd	x	x	x				x	NA	28	Späteste Anwendung 60 Tage vor Abkalben; Ivermectin wirkt nicht gegen Bandwürmer und Leberegel
Optimectin pour-on	Ivermectin	Rind	pour-on	andauernd	x	x	x				x	NA	28	Späteste Anwendung 60 Tage vor Abkalben; wirkt nicht gegen Bandwürmer und Leberegel
Panacur Boli 250	Fenbendazol	Schaf	oral	sofort	x	x	x					6	14 (Leber: 21)	Keine gleichzeitige Behandlung gegen Leberegel (Kombinationsunverträglichkeit)
Panacur SR Bolus	Fenbendazol	Rind (100 – 300 kg)	Bolus	kontinuierliche Abgabe	x	x	x					NA	200	Nicht für tragende Tiere; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmpfimpfung
Panacur suspension 2,5 %	Fenbendazol	Schaf, Ziege	oral	sofort	x	x	x					6	14	Keine gleichzeitige Behandlung gegen Leberegel (Kombinationsunverträglichkeit)
Panacur suspension 10 %	Fenbendazol	Rind	oral	sofort	x	x	x					4	7	Keine gleichzeitige Behandlung gegen Leberegel (Kombinationsunverträglichkeit)
Sebacil 50 %	Phoxim	Rind, Schaf	Besprühen/ Waschung	sofort							x	NA	Rind: 30 Schaf: 42	Räude, Zecken, Haarlinge, Schafausfliegen, Fliegen, Milben
Spotinor	Deltamethrin	Rind, Schaf	pour-on	andauernd							x	Rind: 0 Schaf: NA	Rind: 17 Schaf: 35	Rind : gegen Läuse, Fliegen; Schaf: gegen Zecken, Läuse, Schafausfliegen, Schmeissfliegen; Lamm: gegen Zecken und Läuse
Systemex intervall-bolus	Oxfendazol	Rind (100 – 250 kg)	Bolus	kontinuierliche Abgabe	x	x	x					NA	180	5 Freisetzungen alle 23 Tage; nicht für tragende Tiere; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmpfimpfung
Systemex intervall-bolus forte	Oxfendazol	Rind (200 – 400 kg)	Bolus	kontinuierliche Abgabe	x	x	x					NA	180	Wie Vorhergehendes; zusätzlich 500 mg Wirkstoff; mindestens 14 Tage nach 2. Lungenwurmpfimpfung
Toltranil 5 %	Toltrazuril	Kalb, Lamm	oral	sofort								NA	Kalb: 63 Lamm: 42	Gegen Kokzidien (Prophylaxe und Therapie)
Valbazen 1,9 %	Albendazol	Schaf, Ziege	oral	sofort	x	x	x	x		x		5	12	Nicht in akuter Krankheitsphase bei grossem Leberegel einsetzen; während Deckzeit und 1. Trächtigkeitsmonat nicht anwenden
Valbazen 10 %	Albendazol	Rind	oral	sofort	x	x	x	x		x		3,5	7	Nicht in akuter Krankheitsphase bei grossem Leberegel einsetzen; während Deckzeit und 1. Trächtigkeitsmonat nicht gegen grosse Leberegel anwenden
Vecoxan	Diclazuril	Kalb, Lamm	oral	sofort									0	Gegen Kokzidien <i>Eimeria ssp</i>
Virbamec	Ivermectin	Rind, Schaf	subkutan	andauernd	x	x	x				x	NA	Rind: 28 Schaf: 42	Dasselfliegen, Räude, Läuse, Haarlinge; späteste Anwendung 28 Tage vor Abkalben/Ablammen; nicht intravenös oder intramuskulär
Zolvix	Monepantel	Schaf	oral	sofort	x	x						NA	7	

Legende: Ektoparasiten = Äussere Parasiten NA = Nicht Anwenden bei laktierenden Tieren pour-on = Äussere Anwendung am Rücken subkutan = unter die Haut Bolus = Kapsel im Pansen

Quelle: Tierarzneimittelkompendium September 2023