



Insecticides pour pulvérisation

Règles PER: autorisation nécessaire en PER, sauf pour méligèthes et gros charançon.

Aucun des insecticides de ce tableau n'est autorisé en Extenso, à l'exception du Surrond + Sticker.

Ne plus intervenir si le colza commence à fleurir.

GROUPES INSECTICIDES	GROUPES DE RÉSISTANCE IRAC	MATIÈRE ACTIVE Produit commercial Firmes	Dose de produit kg ou l/ha (...) = efficacité partielle						Protection utilisateur et environnement	Toxicité auxiliaires	Nbre d'applications max. / culture	Prix arrondi CHF/ha
			AUTOMNE			PRINTEMPS						
			Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Tenthrède de la rave	Gros charançon de la tige	Méligèthe	Pucerons				
PYRÉTHRINOÏDE	A	3A CYPERMÉTHRINE Cyperméthrine Sa, Sc	0,25		0,25	0,25			(M)(V) (1pt) <100>, (1pt)	5	1	5
		3A ALPHA-CYPERMÉTHRINE Fastac Perles BF	0,07		0,07	0,07			(A) (1pt) <100>, (1pt)	5	1	5
		3A ZETA-CYPERMÉTHRINE Fury 10 EW** Om	0,1	0,1	0,1	0,1			(6) (1pt) <100>, (1pt), B6	5	1	10
		3A DELTAMÉTHRINE Aligator Om Deltaphar Sc Décis Protech Ba	0,3 0,3 0,5		0,3 0,3 0,5	0,4 0,4 0,65			(V) (1pt) <50>/*<100>, (1pt)	5	1	20 à 30
		3A LAMBDA-CYHALOTHRINE Karaté Zéon Sa, Sy	0,075		0,075	0,1			(1pt) <20>	5	1	10 à 20
		3A LAMBDA-CYHALOTHRINE Ravane 50 Sc TAK 50 EG St Techno LG	0,15 0,15 0,15		0,15 0,15 0,15	0,2 0,2 0,2			(M)(V)(A) (1pt) <20>, (1pt)	5	1	10 à 25
	B	3A ETOFPENPROX Blocker Om	0,2		0,2	0,2	0,2		(V) (1pt) <100>, (1pt)	5	-	30
		3A BIFENTHRINE Talstar SC*** St	0,2			0,2	0,2		(A) (1pt) <50>	5	1	35
NÉONICOTINOÏDE	4A	THIACLOPRIDE Biscaya**** Ba				0,3 à 0,4		(V) (1pt)	5	2	40 à 55	
	4A	ACÉTAMIPRIDE Gazelle SG St				0,125 à 0,15		(1pt)	4	1	20 à 25	
OXADIAZINE	22 A	INDOXACARBE Ammate				0,17		(1pt)	3	1	35	



GROUPES INSECTICIDES	GROUPES DE RÉSISTANCE IRAC	MATIÈRE ACTIVE Produit commercial Firmes	Dose de produit kg ou l/ha (...) = efficacité partielle						Protection utilisateur et environnement	Toxicité auxiliaires	Nbre d'applications max./culture	Prix arrondi CHF/ha
			AUTOMNE			PRINTEMPS						
			Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Tenthrède de la rave	Gros charançon de la tige	Meligèthe	Pucerons				
SPINOSYNE	5	SPINOSAD Audienz Om					0,2			3	1	115
PYRIDINE	9B	PYMÉTROZINE Plenum WG*** Sy					0,15			1	1	40
ARGILE		KAOLIN Surround + Sticker St					20 à 25 +0.15 ⓘ			1		35
CARBAMATE	1A	PIRIMICARBE Pirimicarb Om, Sa Pirimor St, LG, Sy						0,25*	 (1pt)	3	1	20



SPE8 Dangereux pour les abeilles. Ne doit pas entrer en contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat, qu'en dehors de la période du vol des abeilles, autrement dit le soir.



SPE8 Dangereux pour les abeilles. Ne doit pas entrer en contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat.

** Utilisation jusqu'au 1.6.2022

*** Utilisation jusqu'au 1.7.2022

*** Utilisation jusqu'au 31.12.2021

Auxiliaires: source S. Breitenmoser, Agroscope (Breitenmoser S. & Baur R. – *Influence des insecticides sur les auxiliaires dans les céréales et pommes de terre*, Recherche Agronomique Suisse 4 (9): 376–383, 2013).